

### 31. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi Poster Bildiriler P7

## İnflamasyon Ve Ascus Smear Sonuçları Olan Olguların Kolposkopi Ve Kolposkopik Biopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Sadık Şahin<sup>1</sup>, Necdet Süer<sup>2</sup>, Recep Yıldızhan<sup>3</sup>

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E.A.H. <sup>1</sup>

Medeniyet Üniversitesi Göztepe E.A.H. Kadın Hast. ve Doğum Kliniği <sup>2</sup>

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Hast. ve Doğum ABD.<sup>3</sup>

**Amaç:** İnflamasyon ve Ascus smear sonuçları olan olguların kolposkopi ve kolposkopik biopsilerinde servikal displazi oranını araştırmak.

**Metod:** Bethesda sistemine göre smear değerlendirmesinde inflamasyon (n=56) ve Ascus (n=13) tespit edilen hastalara kolposkopi ve kolposkopi eşliğinde biyopsi ve endoservikal küretaj uygulandı. Bu hastalardan elde edilen materyaller histopatolojik olarak değerlendirilerek displazi oranları saptandı.

**Bulgular:** Selim karakterdeki smear neticeleri olan olguların yapılan biyopsilerinde en fazla kronik servisit (%59) gözlemlendi. Bu

kişilerin biyopsilerinin %10.7 'sinde servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) I ve % 1.7'sinde CIN II-III patolojik tanısı kondu. Ascus smear neticesi olan olguların yapılan biopsilerinde en fazla ( %30.7) metaplazi sonucu geldi. CIN I (%15.4) ve CIN II-III (%15.4) tanısı konan olguların oranı eşit olarak gözlemlendi. Ascus pozitif smear örneklemesi CIN I görülme riskini 1.4 kat arttırırken, CIN II-III görülme riskini yaklaşık 9 kat arttırır.

**Tartışma:** Servikal smear örneklemelerinde Ascus smear neticesinin tespit edilmesi selim smear bulgularına göre CIN II-III görülme riskini yaklaşık 9 kat arttırmaktadır. Sonuç olarak, servikal smear incelemesinde Ascus, basit ancak klinik önemi yüksek bir bulgudur.

### 31. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi Poster Bildiriler P8

## Body Stalk Anomalisi : Olgusu

Mesut Polat\*, Resul Arısoy\*, Emre Erdoğan\*, Özgür Aydın Tosun\*, Ahmet Semih Tuğrul\*

\*Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

Body stalk” anomalisi, karın ön duvar defekti, skolyoz, kısa göbek kordonu veya yokluğu ile karakterize nadir görülen fatal bir anomalidir. Burada ultrasonografik tanısı konulmuş body stalk anomalili olgu sunuldu.

Yirmi sekiz yaşındaki gebe, antenatal kongenital anomali ön tanısı ile hastanemize refer edilmiştir. Ultrason ile incelemede batın ön duvarında geniş defekt (defekt içerisinde karaciğer, safra kesesi, mide, barsaklar ve

mesane görüldü), torakolumbal kifoskolyoz, tek arter tek ven içeren kısa umbilikal kordon gibi konjenital anomalilere sahip 16 haftalık fetus gözlemlendi ve body stalk anomalisi tanısı konuldu. Terapötik tahliye yapıldı. Body stalk anomalisi hayatla bağdaşmadığından gebeliğin sonlandırılması düşünülmelidir. Diğer anterior duvar defektlerinden ayırıcı tanısı ve erken prenatal tanısı tedavi planının belirlenmesi açısından önemlidir.